

סעיפי ליקוי מרכזיים המשמשים לקביעת נכות

ניתן להקליק כדי לראות את פירוט סעיפי הליקוי המרכזיים בהם נעשה שימוש בהתאם לסוג הנכות (הפגימה):

[נשימה](#)

[לב](#)

[מחלות והפרעות נפש, PTSD \(פוסט טראומה\)](#)

[גב \(עמוד שדרה צווארי, עמוד שדרה גבי, עמוד שדרה מותני\)](#)

[כתף](#)

[מרפק](#)

[יד \(שורש כף היד ואצבעות\)](#)

[ברך \(מיניסקוס\)](#)

[קרסול](#)

מערכת הנשימה

5. מחלות מערכת הנשימה

א. מחלות חסימתיות כרוניות (להלן - מח"כ) כולל Chronic Bronchitis, Bronchiectasis, Emphysema.

- (1) מח"כ עם תיפקודי ריאות תקינים או עם הפרעה איורורית חסימתית בדרכי נשימה קטנים 1%
- (2) מח"כ עם הפרעה איורורית חסימתית קלה עד בינונית, ללא היפוקסמיה (Fevl = 70%-90%) 20%
- (3) מח"כ עם הפרעה איורורית חסימתית בחומרה בינונית, ללא היפוקסמיה (Fevl = 50%-69%) 40%
- (4) מח"כ עם הפרעה איורורית חסימתית בחומרה קשה, אמפיזמה, עם או בלי היפוקסמיה, ללא היפרקפניה (-30% Fevl 49% 60%) 80%
- (5) כמו האמור בפסקה (4), עם היפרקפניה 80%
- (6) סימנים קליניים, רנטגניים ומעבדתיים של אי ספיקה ריאתית קשה עם היפרקפניה, היפוקסמיה בולטת, לב ריאתי (Fevl > 30%) 100%
- (7) במקרה שהמצב הקליני חמור יותר ולא תואם את מצב תפקודי הריאות ייקבעו אחוזי הנכות זמניים בדרגה אחת גבוהה מהמוגדר בפסקאות (1) עד (4), לפי המתאים.

י. מחלות רסטריקטיביות של הריאה ובית החזה כולל: מחלות של דופן החזה (ליקוי צורה), מחלות נירו-מוסקולריות, מחלות של קרום הריאה (Pleura), Fibrosis Interstitial Diseases, הסננה (Infiltration) -

- (1) ממצאים רנטגניים משמעותיים ללא הפרעה איורורית רסטריקטיבית בתפקודי ריאה 1%
- (2) ממצאים רנטגניים משמעותיים עם הפרעה איורורית קלה ללא היפוקסמיה (VC יותר מ-70% מהנורמה) 10%
- (3) ממצאים רנטגניים משמעותיים עם הפרעה איורורית קלה והיפוקסמיה קלה (VC יותר מ-70% מהנורמה) 20%
- (4) ממצאים רנטגניים בולטים, הפרעה איורורית בינונית, היפוקסמיה קלה (VC - 50%-70%) 40%
- (5) ממצאים רנטגניים ניכרים, היפוקסמיה במנוחה, גוברת במאמץ, הפרעה איורורית מעל בינונית (VC > 50%) 60%
- (6) כמו האמור בפסקה (5), עם מצב קליני ותיפקודי שלא מאפשר מאמץ גופני קל 80%
- (7) מצב קליני ותיפקודי קשה, ריתוק למיטה, זקוק לחמצן ביום ובלילה, לב ריאתי 100%

ז. גוף זר בריאה או חלל הפלאורה

- (1) גוף זר זעיר ללא סימפטומים 1%
- (2) גופים זרים זעירים ללא סימפטומים 5%
- (3) גוף או גופים זרים הגורמים לסימפטומים כגון שיעול, כאבים, זיהום בנוסף לאמור בפסקאות (1) עד (3), אם קיים ליקוי תיפקודי, ייקבעו אחוזי נכות לפי סעיף קטן ו'.

ח. גנחת הסימפונות (Bronchial asthma).

1%	(1) התקפים נדירים, תיפקודי ריאות תקינים במנוחה ובמאמץ, ללא צורך בטיפול
10%	(2) התקפים נדירים, ליקוי קל בתיפקודי הריאות במאמץ בלבד, ללא צורך בטיפול
20%	(3) התקפים קלים, בהפסקות ארוכות. בתיפקודי הריאות הפרעה איורורית חסימתית קלה במנוחה עם החמרה משמעותית במאמץ גופני, טיפול במשאפים בלב
40%	(4) התקפים בכל עונות השנה המחייבים טיפול קבוע. בתיפקודי הריאות הפרעה איורורית חסימתית בינונית עם החמרה בולטת לאחר מאמץ גופני במצבים קשים יותר תיקבע דרגת נכות לפי סעיף קטן א'.

אוטם שריר הלב, מצב לאחר התקף לב

ג. מצב אחרי אוטם שריר הלב (ST. POST MYOCARDIAL INFARCTION)

דרגת הנכות תיקבע על פי השלב התפקודי, חודש לפחות אחרי האוטם -

10%	(1) חולה אי תסמיני, כושר גופני תקין או גבוה במבחן מאמץ
25%	(2) שלב תפקודי I
40%	(3) שלב תפקודי II
75%	(4) שלב תפקודי III
100%	(5) שלב תפקודי IV
	(6) תעוקה אחרי אוטם (POSTINFRACTION ANGINA)
10%	נכות זמנית נוסף לליקוי התפקודי

מחלות נפש, הפרעות נפשיות, PTSD הפרעת דחק בתר חבלתי

33. הפרעות פסיכוטיות ופסיכונרוטיות (PSYCHOTIC AND PSYCHONEUROTIC DISORDERS)

5%	א. הפרעה נפשית מזערית, כושר תפקודי תקין
10%	ב. הפרעה נפשית עם הגבלה קלה בכושר התיפקודי
20%	ג. הפרעה נפשית עם הגבלה בינונית בכושר התיפקודי
	ד. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים ניכרים, קיום צירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעות בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התיפקודי בצורה ניכרת 30%
	ה. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים קשים בקיום קשרים בין-אישיים תקינים ובצירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעה בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התיפקודי בצורה קשה
	ו. הפרעה נפשית המלווה בהפרעה קשה בקיום יחסים בין-אישיים, בבחינת המציאות ובשיפוט, בצירוף סימנים אובייקטיביים קשים של ירידה בסף הגירוי, בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילה את הכושר התיפקודי בצורה קשה

ביותר 70%

100% ז. מצב נפשי חמור ביותר עם אי-יכולת מוחלטת לתפקד באופן עצמאי, צורך בסיוע מתמיד בחיי יום-יום או צורך באשפוז

34. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

דרגת הנכות הקבועה לצד פגימה גופנית כוללת גם את הנכות הנפשית הנובעת ממנה; אולם אם מצאה הועדה הרפואית כי התגובה הנפשית חורגת בעוצמתה מזו ההולמת את אותה פגימה, רשאית היא לקבוע דרגת נכות נוספת עבור התגובה הנפשית, כמפורט להלן:

- (א) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית ומהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה פגימה; כושר תפקודי נפשי תקין 5%
- (ב) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית ומהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה פגימה; קיימת הגבלה קלה בכושר תפקודי נפשי
- (ג) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית ומהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה פגימה; קיימת הגבלה בינונית בכושר התפקודי הנפשי
- 20% (ד) תגובה נפשית שנובעת ישירות מהנכות הגופנית ומהווה תגובה חורגת מהרגיל מזו ההולמת את אותה פגימה; קיימת הגבלה ניכרת בכושר התפקודי הנפשי - ייקבעו אחוזי נכות נפרדים בהתאם לסעיף 33ד, ה, ו או ז.
- (ה) נכות נפשית כתוצאה מפגיעה מוחית תיקבע בהתאם לסעיף 29(11).

34א. א. הפרעה נפשית מזערית, כושר תפקודי תקין 5%

10% ב. הפרעה נפשית עם הגבלה קלה בכושר התפקודי

20% ג. הפרעה נפשית עם הגבלה בינונית בכושר התפקודי

ד. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים ניכרים, קיום צירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעות בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן ניכר 30%

50% ה. הפרעה נפשית עם סימנים אובייקטיביים קשים בקיום קשרים בין-אישיים תקינים ובצירוף הפרעות של סף גירוי נמוך, הפרעה בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה

70% ו. הפרעה נפשית המלווה בהפרעה קשה בקיום יחסים בין-אישיים, בבחינת המציאות ובשיפוט, בצירוף סימנים אובייקטיביים קשים של ירידה בסף הגירוי, בריכוז, בחשיבה, באפקט, בכוח ההתמדה וברציה, המגבילות את הכושר התפקודי באופן קשה ביותר

ז. מצב חמור ביותר עם אי יכולת מוחלטת לתפקד באופן עצמאי, צורך בסיוע מתמיד בחיי יום יום או באשפוז

עמוד השדרה הצווארי, עמודה השדרה הגבי, עמוד השדרה המותני

		(1) קיבוע עמוד השדרה	37.
		א. קיבוע עמוד השדרה הצווארי (Cervical Ankylosis)	
30%		י. בזווית נוחה	
50%		י. בזווית בלתי נוחה	
		זווית נוחה - הקיבוע הוא בגדר היציבה התקינה;	
		זווית בלתי נוחה - היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר.	
		ב. קיבוע עמוד השדרה הגבי (Dorsal Ankylosis)	
10%		י. בזווית נוחה	
30%		י. בזווית לא נוחה	
		זווית נוחה - זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית-אחורית חדה.	
		ג. קיבוע עמוד השדרה המותני (Lumbar Ankylosis)	
30%		י. במצב נוח	
40%		י. במצב בלתי נוח	
50%		י. במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת, ביציבה	
		מצב נוח - שמירה על היציבה בגבולות הנורמה;	
		מצב בלתי נוח - שינוי ניכר או גס ביציבה.	
		ד. קיבוע מוחלט של כל עמוד השדרה	
60%		י. בזווית נוחה	
100%		י. בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר	
		זווית העולה על 30 מעלות לגבי הקו המאונך נחשבת לבלתי נוחה.	
		(2) הגבלת התנועות בעמוד השדרה	
		א. הגבלת התנועות בעמוד השדרה הצווארי (Cervical Spine)	
		י. כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות 1%	
5%		י. הגבלה מזערית	
10%		י. הגבלה קלה	
20%		י. הגבלה בינונית	
30%		י. הגבלה קשה	
		י. אי-יציבות של עמוד השדרה הצווארי שהוכחה	
30%		בצילומי רנטגן בתנוחות שונות	
		ב. הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (Dorsal Spine)	
		י. כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות 1%	
5%		י. הגבלה מזערית או קלה	
10%		י. הגבלה בינונית או קשה	
		ג. הגבלת התנועות בעמוד השדרה המותני (Lumbar Spine)	
		י. כאבים כרוניים, מתועדים, ללא ממצא אורגני וללא הגבלת תנועות 1%	
5%		י. הגבלה מזערית	
10%		י. הגבלה קלה	
20%		י. הגבלה בינונית	

30%	V. הגבלה קשה
	(3) שברים בעמוד השדרה
	א. מצב אחרי שבר בגוף החוליה
1%	I. ללא תזוזה וללא שינוי צורה
5%	II. עם תזוזה קלה
10%	III. עם תזוזה ניכרת
20%	IV. עם שינויי צורה ותזוזה קשים
	ב. שבר של זיז החוליה (Processus)
1%	I. שבר לא מחובר של זיז רוחבי (Processus Transversus)
5%	II. שבר לא מחובר של זיז קוצי (Processus Spinosus)
	ג. שבר לא מחובר בעצם הזנב (Coccygeum) או עצם הסקרלי (Sacrum)
1%	I. ללא תזוזה
5%	II. עם תזוזה

בנוסף לשבר בעמוד השדרה, תיקבע נכות בגלל הגבלה בתנועות עמוד השדרה או הפרעות נוירולוגיות בהתאם למיקום האנטומי.

כתף

			41. (1) נגיעה חוזרת של הכתף Recurrent Dislocation (Humero-scapular)
	<u>ימין</u>	<u>שמאל</u>	א. בקיעות שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם
20%	20%	30%	ב. נגיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה
30%	40%		ג. נגיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית
	5%	5%	ד. לאחר ניתוח - פעולת הזרוע טובה
	40%	50%	(2) מפרק נד של הכתף (Flail Shoulder)
	25%	30%	(3) קשיון (Ankylosis) של פרק הכתף
	40%	50%	א. קשיון נוח
			ב. קשיון לא נוח
			בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 450-500 מהגוף בתנוחת-מה קדימה
			בקשיון לא נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 250 מהגוף או בריחוק מעבר ל-060
			(4) הגבלת התנועות בפרק הכתף
	1%	1%	א. מעל לגובה השכם
15%	15%		ב. עד לגובה השכם
25%	25%		ג. עד 45° מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה
	35%	35%	ד. עד 30° מהגוף

<u>שמאל</u>	<u>ימין</u>	
		א. Trapezius, Serratus magnus, Levator scapulae
10%	10%	י. בצורה בינונית
10%	20%	י. בצורה ניכרת
20%	30%	י. בצורה קשה
		ב. Pectoralis major, Minor, Latissimus dorsi, Teres major
10%	10%	י. בצורה בינונית
20%	20%	י. בצורה ניכרת
30%	30%	י. בצורה קשה
		ג. Deltoideus
10%	20%	י. בצורה בינונית
20%	30%	י. בצורה ניכרת
30%	40%	י. בצורה קשה
		ד. Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis, Coracobrachialis
10%	10%	י. בצורה בינונית
10%	20%	י. בצורה ניכרת
20%	30%	י. בצורה קשה

מרפק

(5) פרק המרפק

		א. מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות תפקודיות
1%	1%	
		ב. מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזוויות כגון Cubitus varus; Cubitus valgus או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות
10%	10%	
		(6) קשיון במרפק
20%	30%	א. קשיון נוח
30%	40%	ב. קשיון לא נוח
		קשיון נוח משמע - תנוחת המרפק בזווית שבין 070 עד 090 (ראה ציור מס' 1) ובעמדה אמצעית של האמה;
		קשיון לא נוח - תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל עם הגבלה בסיבובי האמה (Pro-supinatio)

(7) הגבלת התנועות במרפק

<u>שמאל</u>	<u>ימין</u>	א. הגבלות בכיפוף
		קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ-250 והכיפוף אפשרי

30%	40%	מ-00 עד 350	א. I.
20%	30%	מ-00 עד 060	א. II.
10%	15%	מ-00 עד 900	א. III.
1%	1%	מ-00 עד 1500	א. IV.

ב. הגבלות ביישור

קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ-1500 עד ל-900 והיישור אפשרי עד לתנוחה

30%	40%	של 900	א. I.
10%	15%	של 060	א. II.
10%	10%	של 300	א. III.
1%	1%	מ-00 עד 1500	א. IV.

(2) פציעת שרירי המרפק

א. Brachialis, Brachioradialis, Biceps,

10%	10%	בצורה בינונית	א. I.
20%	20%	בצורה ניכרת	א. II.
30%	30%	בצורה קשה	א. III.

ב. Triceps, anconeus

10%	10%	בצורה בינונית	א. I.
20%	20%	בצורה ניכרת	א. II.
30%	30%	בצורה קשה	א. III.

ג. Flexor carpi, digiti

10%	10%	בצורה בינונית	א. I.
10%	20%	בצורה ניכרת	א. II.
20%	30%	בצורה קשה	א. III.

ד. Extensor carpi, digiti

10%	10%	בצורה בינונית	א. I.
10%	10%	בצורה ניכרת	א. II.
10%	20%	בצורה קשה	א. III.

ידיים

(10) שורש היד

1%	1%	מצב אחרי חבלה בפרק כף היד, הפרעות מזעריות בתנועות	א.
15%	20%	קשיון נוח	ב.
30%	40%	קשיון לא נוח	ג.
		קשיון בעמדה בינונית, בין נוח ובין לא נוח 20%30%	ד.

קשיון נוח - כף היד נמצאת בכיפוף גבי של 150-250 ובאבדוקציה אולנרית או

נויטראלית.

קשיון לא נוח - כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית.

5%	10%	ה. הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של 150
20%	30%	ו. איבוד ה-Pronatio וה-Supinatio, היד קבועה במצב של Supinatio או Hyperpronatio
10%	20%	ז. איבוד ה-Supinatio וה-Pronatio או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של Pronatio בעמדת נויטרלית

הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון Pseudoarthrosis of carpal-scapoid; Lunatomalacia etc. אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35.

43. (1) אגודל

		א. קטיעת אגודל עם עצם המסרק או חלק ממנה 20%25%
15%	20%	ב. קטיעת שני גלילים או גליל וחצי
10%	15%	ג. קטיעת הגליל הסופי
8%	8%	ד. קטיעת חצי הגליל הסופי

(2) אצבע 2

		א. קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה 12%15%
10%	12%	ב. קטיעת לפחות 2 גלילים
10%	10%	ג. קטיעת 2 או 1 גלילים
5%	5%	ד. קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו

(3) אצבע 3

		א. קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה 12%15%
10%	12%	ב. קטיעת לפחות 2 גלילים
10%	10%	ג. קטיעת 2 או 1 גלילים
5%	5%	ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו

(4) אצבע 4 או אצבע 5

10%	10%	א. קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה
	8%	ב. קטיעת לפחות 2 גלילים
	5%	ג. קטיעת 2 או 1 גלילים
	5%	ד. קטיעת גליל סופי או חצי ממנו

44. קשיון לא נוח של האצבעות - קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאפשר תפיסה או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות:

קשיון לא נוח של האגודל - תנוחה המונעת אחיזה;

קשיון נוח - קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (Pinch) -

10%	10%	(1) קשיון לא נוח של האצבעות - ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי ראש עצם המסרק
		(2) קשיון נוח של האגודל

	7%	7%	(3) קשיון נוח של אצבע 2	
	5%	5%	(4) קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5	
7%			(1) של האגודל או של אצבע 2	.45
5%			(2) של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1 ואצבע 2) לכל אצבע	

ברך

			(2) הברך	
30%			א. אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד)	
30%			ב. אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף 20%	
50%			ג. קשיון נוח	
			ד. קשיון לא נוח	
			קשיון לא נוח - פירושו: עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ-1° (genu recurvatum) או כיפוף ביותר מ-30° או סטיה צדדית (varus valgus) של יותר מ-20°.	
			ה. הגבלת תנועות הכיפוף	
1%			א. הכיפוף אפשרי בזווית מ-0° עד 90°	
5%			א. הכיפוף אפשרי בזווית מ-0° עד 70°	
10%			א. הכיפוף אפשרי בזווית מ-0° עד 45°	
20%			א. הכיפוף אפשרי בזווית מ-0° עד 30°	
30%			א. הכיפוף אפשרי בזווית מ-0° עד 15°	
			א. הגבלה ביישור הברך	
1%			א. יישור הברך אפשרי עד 5°	
10%			א. יישור הברך אפשרי עד 10°	
20%			א. יישור הברך אפשרי עד 15°	
40%			א. יישור הברך אפשרי עד 30°	
50%			א. יישור הברך אפשרי עד 45°	
			ז. נזק במניסקוס	
10%			א. נזק במניסקוס בצורה קלה	
20%			א. נזק במניסקוס עם Locking	
1%			א. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות	
			א. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים	
10%				

קרטול

(3) קרטול

א. הגבלה בתנועת פרק הקרטול

- 5% I. בצורה קלה
- 10% II. בצורה בינונית
- 20% III. קשיון נח
- 30% IV. קשיון לא נח

ב. נקע בקרטול

קביעת דרגת הנכות תתבסס על בדיקה קלינית וצילום מתיחה השוואתי (stress roentgenogram)

- 1% I. מצב אחרי נקע יותר מפעמיים ללא עדות לפגיעה ברצועות, וללא פתיחה משמעותית
- 5% II. אי-יציבות של הרצועות, בצורה קלה עד בינונית, פתיחת יתר (excess opening) מעל 5° עד 10°
- 10% III. אי-יציבות של הרצועות בצורה ניכרת, פתיחת יתר מעל 10° עד 15°
- IV. אי-יציבות של הרצועות בצורה קשה, פתיחת יתר מעל 15° 20%

פחת (פסוראזיס)

- 1% 89. (א) בצורה מזערית או ברמיסיה
- 5% (ב) בצורה קלה
- 20% (ג) בצורה בינונית
- 30% (ד) בצורה קשה